



OralStudio Fogászati és Szájsebészeti Szakorvosi Ambulancia
Dentistry, Oral & Maxillofacial Surgery – Zahnheilkunde, Kiefer-, und Gesichtschirurgie
H-1126 Budapest, Böszörményi u. 2. Tel: (+36 1) 224 7920 Fax: (+ 36 1) 224 7929
Email: info@oralstudio.hu

Dr Huszák András szájsebész szakorvos, ügyvezető

Im Interesse einer möglichst erfolgreichen Heilung, lesen Sie bitte das Wichtigste hier:

- Essen darf man erst, sobald die Wirkungen der Betäubung verfliegen sind (ca. 2-3 Stunden). Auf den Genuss von heißen Mahlzeiten und Getränken sowie Milchprodukten, sollte in den folgenden Tagen der Behandlung verzichtet werden.
- Das Rauchen behindert stark die Wundheilung und erhöht um ein vielfaches Risiken, die durch den Eingriff entstehen können. Wenn Sie rauchen, bitten wir Sie am Tag des Eingriffs auf dieses ganz zu verzichten und in den folgenden Wochen den Konsum auf ein Minimum zu reduzieren.
- Am Tag nach dem Eingriff muss das Gebiet rundum die Wunde und auch die Nähte gesäubert werden. Wir empfehlen hierzu ein feuchtes Ohrstäbchen zu benutzen. Wir empfehlen eine weiche Zahnbürste für die Zahnpflege und ein desinfizierendes Mundwasser namens “ Corsodyl” zu gebrauchen. Letzteres ist in Apotheken erhältlich. Die Lebensdauer des eingesetzten Zahnersatzes wird maßgeblich durch die Mundhygiene beeinflusst. Die gründliche Reinigung der Mundhöhle und der gesamten Zähne ist Voraussetzung für den Erfolg der Behandlung. Eine sehr wichtige Aufgabe ist es, die Bereiche um das Implantat speziell zu säubern.
- Schwellungen im Bereich der Wunde können durch das Auflegen von Eis außerhalb der Mundhöhle gelindert werden. Der eisige Gegenstand (z.B. in der Apotheke erhältliches Eisgelee oder eine halbvolle und halb gefrorene Milchtüte) darf nicht unmittelbar auf die Haut gepresst werden. Er sollte mit Textilien umwickelt werden. In einer Stunde sollte maximal nur zehn Minuten gekühlt werden.
- A felírt gyógyszereket (fájdalomcsillapító, antibiotikum) előírás szerint kell bevenni.
- Tiefes Bücken oder das Heben schwerer Gegenstände sollte tunlichst vermieden werden.
- Trotz alldem ist es vorstellbar, dass der Bereich um die Wunde herum anschwillt. Sorgen Sie sich nicht, da dies die natürliche Folge des Eingriffs sein kann.
- Die Nähte entfernen wir innerhalb einer Woche.
- Melden Sie sich bei uns, sofern ungewöhnliche Beschwerden auftreten sollten.